四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷三百一

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣金光悌

謄録監生臣王頎修

普濟方卷三百五　　明　周王朱橚　撰

下部瘡門

下部瘡總論

陰瘡者有三等一濕陰瘡二妬精瘡三陰蝕瘡又曰下疳瘡蓋濕者由腎經虛弱風濕相搏邪氣乘之瘙痒成瘡浸淫汗出狀如癬瘡是也妬精由壯年精氣盈滿久曠房室陰上生瘡赤腫作膿妨悶痒痛是也陰蝕瘡由

腎臟虛邪熱結下焦經絡痞澁氣血不行或房勞洗浴不潔以致生瘡隱忍不醫焮痛尤甚袖瘡在裡手指無妨疼痛注悶或小便如淋陰丸腫痛或經十數日潰爛血濃肌肉侵蝕或血出不止以成下疳若身體壯熱煩渴惡寒宜急之以大豆甘草湯漬之潰毒湯洗之服五香連翹漏蘆湯踈之更以截疳抵聖散乾摻四畔摩風膏潤之後以將護忌慎之渴不止者竹葉黃耆湯大便軟者服托裡茯苓等藥調治之。腎臟風論曰實則為

痛虛則為痒癢之出於腎虛也明矣腎屬足少陰之經囊問濕痒謂之腎臟風世所共知也孰知宗筋聚於陰器足厥陰之肝系焉惟腎主虛惟肝主風人之精血不充內為嗜欲所耗外為風冷所乘風毒濕氣皆從虛入囊間其有不痒濕者乎脚下其有不瘡瘍者乎療治之法先當䟽散風邪流行濕毒夫然後以芎歸活血與細辛蒺藜驅風數輩潤養而平治之若欲遽用川烏故紙燥裂之劑吾恐攔住內邪病無由愈間有患者為酒麵

炙爆所傷腎虛而挾熱如猪肚黄連蒸為丸子不可無其或不施藥餌一切從事於熱湯雖沃之暫止然眞氣愈泄肝腎愈虛或者未知攸濟耳

方

宣毒方　治腎餘氣瘡

苦參　荆芥　當歸　川芎　玄參　白芷各半兩

黑牽牛一兩半　烏蛇一條　青黛半兩一半入藥一半為衣

右先將牽牛巴豆肥白者去殼三十粒慢火炒令巴

豆黑色去巴豆用黑牵牛同前九味為細末却將煨熟大蒜擂細看稠得所丸時入糊和丸如梧桐子大每服十丸塩酒下

浴毒丸出瘡科精要方　治小腸風陰瘡痒痛

木通　藁本　枳殻　管仲　白芷　荆芥　甘松　薄荷各等分

右㕮咀用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升熱

洗浴瘡

陰瘡膏 治男女陰瘡

米粉一酒杯許 芍藥 黄芩 牡蠣 附子 白芷各十八銖

右㕮咀以不中水猪膏一斤微火上煎三上三下候白芷黄膏成絞滓去内白粉和傅瘡上

猪蹄湯出聖惠方 治陰瘡濃血不絶

猪蹄二枚 黄柏三分剉 敗醤三分 黄芩半兩 黄連三分 甘草一兩剉 營實根一兩

右擣羅為散用漿水二升煎至一升半熱用洗之

七寶檳榔散出德生堂經驗 治下元玉莖上或包頭内有瘡瘡漸至蝕透不愈者

檳榔 蜜陀僧 雄黄 輕粉 黄連 黄栢 朴硝各等分

右為細末入麝香一字和匀再研細先用葱白漿水洗淨軟帛揜乾如瘡濕乾摻如乾小油調塗

玉粉散 治下陰瘡疼不止

寒水石煅　蜜陀僧　滑石各半兩　膩粉　麝香各少許

右為細末油膩或乾貼

牡蒙散出聖惠方　治陰下生瘡濕痒失精

牡蒙　菟絲子　栢子仁　蛇床子　蓯蓉各二兩

右治下篩酒服方寸匕日三以瘥為度一方無蛇床子

宣風散出仁齋直指方　治踈肝腎風

大鷄心檳榔二箇　橘皮半兩　甘草焙三錢　牽牛生取
末一兩炒

右為末每服二錢蜜湯調下

全蝎散出仁齋直指方　治腎臟風發瘡疥

鷄心檳榔一大箇破開以黃丹一錢合在內溫紙裹煨　明硫黃研二錢

生黃丹一錢　全蝎三枚焙

右為細末入輕粉半錢麝香少許於磁器收每用少

許蘇油調抹兩掌先以鼻臭男以兩掌掩外腎女以

兩掌撑兩乳各睡至醒次日又如此用藥屢效

又方出仁齋直指方

右用大紅川椒去目水醮濕半日夾生杏仁研膏擦手如上法亦驗

烏頭丸出衛生家寶方　治腎臟風上攻下疰生瘡並癬

川烏二兩　草烏一兩二味以黒豆半升煮透軟去皮切日乾　天麻

地龍去土秤　白附子各半兩

右為細末酒糊為丸桐子大每服二三十丸空心食

前鹽酒或鹽湯下

輕黄散　治水莖上生瘡不乾見骨者

大黄三錢燒灰存性　黄栢二錢燒灰存性　輕粉少許　久年壁土東向者一錢

右先用温熱水洗淨血水以綿帛拭乾然後藥乾掺

切忌房室

硫黄散出聖惠方　治陰上生瘡

硫黄半兩　赤石脂半兩　麝香一錢　膩粉一錢

右藥都和如粉每先以甜淡漿水溫洗令淨裛乾貼之

牡蠣散 治陰囊兩傍生瘡或陰濕出水甚痒甚苦夜則抓之無定後必自痛或兩腋汗脚板心常濕汗無所柰何此藥主之予親得此症受苦數十年得此方隨用二三日如法搽之二十年餘不發實為神效

枯白礬四兩 黃丹砂二兩 牡蠣粉二兩

右為細末遇夜睡手捏藥於痒處痛擦之不一時又

搽之三四次後頓減次夜再搽雖大減又搽後自然平復如腋汗亦有頓搽方可脚汗先搽大減又搽後裝藥靴或鞋底上脚板上塗藥纏脚裹之亦可

麻黃根粉　治腎勞熱陰囊生瘡

麻黃根　石硫各二兩　米粉五合

右治下篩安絮如常用粉法搽瘡上粉溫更搽之

胡連散　治陰生瘡腫痛

胡粉三錢　黃連末一錢　五倍子末一錢

右藥都和研為散先以甘豆湯洗淨拭令乾以藥末傅於瘡上日再用之

天雄散 治陰生瘡腫痛

天雄一末 膩粉一錢 麝香一錢

右細研為散以溫漿水洗瘡淨後用津液塗之

夾塩散 治陰瘡及惡瘡

皷子草根一把 大麥三十粒 塩少許

右擣令爛傅瘡上一易經三日後三日一易

遠志散　治莖中痛囊津液不行

遠志去心　五倍子焙　蛇床子各等分

右爲細末每用藥末五錢水三升入葱白三寸同煎

五沸去滓熱淋渫效

桑枝湯　治陰瘡

桑枝三握剉　葱二握

右以水三升煎至二升去滓稍熱浴瘡上一方水煎

桑白皮湯洗之

蚯蚓散　治陰莖瘡

豆粉一分　蚯蚓二分

右用水研塗上乾又傅之一方用豉一分

黄白散　治近穀道四畔時復生泡痒而生痛無非風毒流行去風乾水足矣

黄栢皮　黄連去須　白礬煆過　白蛇皮燒灰各等分

右為細末重篩入麝香臘茶末各少許和匀津唾調塗過痒爪破水出即塗如水多即乾搽

石灰散　治腎漏陰囊先腫後穿破出黃水瘡如魚口

能致命

右用五倍子同石灰炒黃色去灰攤地出火毒炒盆

內研為細末不犯銅鐵乾搽瘡上五七次愈

又方

右用豆豉燒灰貼之

蛇床散　治陰囊生瘡疼痛

右用川椒荆芥火撚草蛇床子煎湯洗後用鷄清調

朴硝末塗之即見效

荆芥湯 治玉莖上生瘡

右先用荆芥黄栢煎洗後用黄白眞蚌粉荆芥青黛

為末乾摻瘡上

丹胞散 治莖上生瘡臭爛者

右以猪胞一箇連尿去一半用新磚兩塊炭火煆新

磚將猪胞連尿於磚上焙乾不住手一向移放於兩

塊磚上輪流不歇莫與火煆過胞以尿乾為度研為

末入黄丹一錢先用葱湯以鵝毛沫洗以舊綿帛滲乾此藥搽三五次立見效

鱉灰散　治丈夫陰頭癰不能治者

右用鱉甲頭燒灰以鷄子白和傅之及治婦人陰脫

肛

地連散　治玉莖上生瘡

右用地骨皮煎湯洗訶子連核燒存性為末乾摻

川連散　治下部注瘡

右用黄連為細末漿水調成餅攤於碗面上内用艾及川甲三片燒烟覆椀薫成黒色再取下如是者五次以黄連餅黒色為度地上出烟毒再研細濕塗乾清油調塗三四先用黄白藿香茵蔯煎湯溫洗

煎蚕散　療男子陰瘡損爛

右爛煮黄柏洗之又用白蚕塗之一方蚕炙燋為末傅於瘡上

蠟茶湯　治陰囊上瘡

右用臘面茶為末先以甘草煎水洗後用貼妙

猪脂散　治天行䘌瘡

右用猪蹄燒灰以猪脂和傅日五六用

桃熊散　治熱病後下部生瘡

右取濃煮桃白皮如稀餳内少許熊膽以綿蘸藥内

下部瘡上

黄栢散　治揩𤸇

右先用熱温水洗過揩痛處即用黄白皮末一錢和

匀新米泔調塗或用新米泔調服三五服

水瘡湯　療陰瘡陰邊如粟粒生瘡及濕痒

右以槐北面不見日處白皮一大握鹽三指一撮以水大二升煮取一升洗之三五遍適寒温用苦涉遠恐衝風即以米粉和塗神效

蠟燭平胃膏　治腎臟風瘡

右用平胃散以蠟燭油煎過候冷調傅瘡愈

合掌散　治腎臟生瘡

右用檳榔硫黄爲末臨睡用香油調掌心上鼻臭之即以藥掩外腎睡二三日用之效

治陰痒生瘡

右嚼胡麻塗之驗

治水埊上生瘡不乾見骨者

右用烏賊魚骨末按滿瘡口以紙纒之

治㯼檔

右用嫩楓葉挪爛擦之立愈

又方

右用老鴉酸草又名酸毒草挪爛揩擦以冷水洗之

又方

右用馬屁勃即灰菰尋常採收如有此疾先用温水或冷水輕輕洗淨以菰為末摻患處如新菰不必為末將菰擦患處

治男子腎生瘡癬作痒

右以百草霜用香油調搽立效

治陰囊上瘡

右用甘草煎湯温洗即用臘茶末就傅貼一方同地龍糞輕塗

治天行䘌下部生瘡

右濃煮桃皮如糖以內下部中若口中有瘡含之

治陰瘡

右用狼牙五兩細剉水五升煮至三升温洗之

治下部生瘡已成洞口

右服牡丹方寸日日三服

又方　用桃皮葉杵水漬會濃者去滓着盆中漬之蟲出

療男子陰瘡

右以蜜煎甘草末塗之大良比有人患塗頭瘂次下瘡欲斷者以猪肉湯漬洗之後用黄連黄栢等為末傅之

治陰痒痛　右用車前子以水三升煮三沸去滓服

治陰生瘡　右燒杏仁研為末傅之

淫汁方　治莖物腫爛

右用大腹皮一升夾苦參荆芥煎湯溫洗拭以津唾塗次用油髮燒存性入些白艾末傅逐日煎湯洗換藥或用乳香龍骨散仍服蠟礬丸並髮灰用米飲調下

淋渫藥　治莖痛囊縮津液不行

右用蛇床子去皮揀淨四兩為麄末每用藥一兩水

二碗煎一碗半去滓乘熱薰下部候通手淋浴臨睡

用

松節散 治腎風瘡

右用松節和羖羊屎白礬一處燒瀝油搽瘡上立效

治下部養蟲方出聖惠方

硃砂一分細研 白礬一兩燒灰 芎藭半兩

右為末每用綿裹一錢内下部中日再易之

又方出聖惠方 用蛇一條如指麄者掘地作坑置蛇於中

燒之取有孔板覆坑上坐薰之其虫盡出

神効方出仁齋直指方 治莖頭三五孔小漏瘡出血微濃

右用香髮燒存性灰傅乾則津唾調髮灰食前服

烏喙湯 治若有瘜肉突出

右以苦酒三升浸烏啄五枚三日一洗一日夜三四

度瘥

治陰下濕導引法

養方道引法云卧令兩手布膝頭取踵置尻下以口

內氣腹脹自極以鼻出氣七息除陰下濕少腹裡痛
膝冷不隨

治人下部中痒出千金良方
右以蒸棗取膏以水銀熟研丸之令相得長二三寸
以綿薄裹內孔中蟲出瘥

治穀道中瘡 右以水中荇葉細擣綿裹內下部日三

胡粉散 療陰瘡
黃栢 黃連各三分 胡粉一合

右為末粉土日三婦人綿裹棗核大內之

肘痛如刺方出肘後方　但服生射干汁取下亦可服九藥

下之云作走馬湯亦在尸注中有

訶子散　治妬精瘡

有富家子唐靖者年十八九未娶忽於陰頭上生瘡

初祇針眼大畏疼不敢洗刮日久連莖爛一二寸許

醫不止用膏藥貼之愈疼有道人周守真謂此名下

疳瘡亦名妬精瘡緣此為後生未娶精氣溢盛陽過

興起當泄不泄不泄強泄脹斷嫩皮怕痛失洗日久遂爛有害性命若治此瘡須是斷房事數月先用荊芥黃栢皮馬鞭草剉入葱煎湯洗令去濃靨以訶子燒灰入麝香乾摻患處令睡時喫冷水兩三口勿令陽道興起腸斷瘡靨靨堅即安

雙妙散出十便良方 療男子陰卒腫方

鷄翮六枚燒 蛇床子等分

右二味為末以飲少許隨卵左右取鷄羽

又方出十便良方　煮桑根皮汁洗之

又方出十便良方　治陰下濕痒成瘡

吳茱萸三合

右用水三升煮三五沸以洗之諸瘡亦甚妙也

治蟲已食下部肛盡腸穿者亦用長股蝦蟆青背者一枚鷄骨一分並燒灰為末合吹下部令深入數用大

驗

治下部蟲䘌

用梅葉桃葉杵一斛蒸之令極熱內小器中大布上坐蟲死

茴香散出千金方　治陰瘡風冷所傷疼痛方

白蒺藜　附子　茴香子

右件藥等分搗細為散每於食前以温酒調下二錢

止痛丸出聖惠方　治陰痛不可忍

吳茱萸二兩　檳榔一兩　茴香一兩

右件擣羅為末用醋煮麵糊和丸如梧桐子大不拘

時候以熱酒下二十丸

陰頭生瘡

溪螺 溪港中螺也舊者為妙

右甘鍋煅過為細末仍先以塩水洗五七次後以此

藥傅之

又方 治穀道生泡痒而復痛此風毒流行證

枯礬 半字

和勻米泔調塗此方專治行路楷襠穀道痛仍用水

先洗

唾調散出本草　治同前

右五倍子末唾調傅

治陰頭上生瘡出本草　治以蜜煎甘草塗之瘥

治陰莖上瘡痛爛出本草

用豉一分蚯蚓濕泥二分水研和塗上乾易禁熱食

酒菜綜

治毒攻下部生瘡者出本草

用槲苦皮合櫸皮煮汁如飴糖以導之

一方出本草 治腎瘡腰痛

用蛇床子五倍子蕪荑煎湯以帛囊盛稍熱洗之先以鹽洗眼或以蕪荑剪草黄連全蝎黄栢末蔴油調之傅

濕陰瘡附論

夫虚勞陰瘡者為腎氣榮於陰今腎虚不能榮則津液汗出於陰也虛則為風邪所乘客於腠理而正氣不洩

邪正相干在於皮膚故痒搔之則生瘡也

方

天雄丸治虚勞陰萎濕痒搔之汁生瘡小便淋瀝或赤黄莖中痛甚者失精劇苦尿血目視䀮䀮得風淚出脚弱不能久立宜服

天雄一兩炮裂去皮臍　蛇床子三分　細辛半兩　川大黄半兩剉碎為妙　杜仲三分去粗皮炙微黄剉　栢子仁三分　白茯苓三分　防風半兩去蘆頭　萆薢三分剉　菖蒲三分　澤

瀉三分　蓯蓉三分　桂心三分　遠志半兩去心　川椒半兩

去目閉口者微炒出汗　牛膝三分去苗　石斛半兩去苗　山茱萸

三分　白朮三分

右擣羅為末鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每

服食前以溫酒下三十丸

蛇床子丸　治虛勞陽氣衰絶陰萎濕痒生瘡

蛇床子三分　續斷半兩　薯蕷半兩　桑寄生半兩　肉

蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾　附子半兩炮製去皮臍　菟絲子

一兩酒浸三日曝乾別搗為末 遠志半兩去心 萆薢半兩小潤去浮者水煮芽出焙乾為黒色

右擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸如梧桐子大每服食前以温酒下三十丸

小浴方 治虛勞陰濕痒生瘡

川椒一兩半 蛇床子 苦參一兩半 白礬一兩 香附子一兩 桂心三分 白芷一兩 狗脊一兩 細辛一兩

右擣麁羅為散每用一兩以水三升煎至二升去滓

入盆子內但承熱氣坐盆子上薰之良久通身便洗
患處甚者不過三五度
乳香龍骨散　治外腎濕痒淫爛如㾦
龍骨　生石膏　五倍子各一分　白芨　乳香
黄革丹各半分　麝少許
右為細末先以苦參大腹皮紫蘇莖葉温洗後傅
螵蛸散　治虚勞陰濕生瘡
桑螵蛸灰一分　牡厲粉半兩　米粉一分　胡粉一分

麒麟竭一分　蜜陀僧一分

右研細末如粉用塗瘡

沐浴長春散　治男子下元虛濕久冷陰囊左右夜痒抓之則喜任之則痛成瘡流水為害甚苦此藥見效及婦人下部陰濕胎元冷

牡蠣　蛇床子　破故紙　官桂　紫稍花　乾荷葉各等分

右㕮咀每服一兩半水一小鍋入葱白數莖煎至八

分去滓先薫後洗却用枯礬一兩半入黄丹半兩蛤粉半兩一處和匀研末洗用手揑藥搽濕痒處

螵蛸散　治陰瘡或痒

桑螵蛸灰一分　胡粉一分　硃砂一分　騏驎竭一分

右研細如粉貼於瘡上

黄粉散　治陰囊上生瘡黄水流注有妨行步

五倍子　黄栢　滑石　輕粉等分

右為細末貼之數次即愈

硫黄散 治虚勞陰濕生瘡

麻黄根末半兩 硫黄半兩細研 米粉一分

右研令勻細每用如粉塗之

麒麟竭散 治虚勞陰濕生瘡

麒麟竭半兩 坐拏三兩 黄蘗半兩

右搗羅為末入膩粉一分都研令勻如瘡破有濃水即乾上如無濃水即以生油調塗

臘茶散 治陰瘡痒瘡出黄水久不瘥者一名五信散

臘茶　五倍子各等分　膩粉少許

右為細末先以漿水葱湯洗之頻傅椒湯尤佳一方不用臘茶

黃龍散　治濕乾瘡癬黃汁浸滛色如香瓣

黃栢　龍骨　赤石脂各一兩

右為細末好酒調掃瘡或乾貼之

槐白皮湯出聖惠方　治虛勞陰濕痒生瘡

槐白皮二兩　黃栢一兩半　香茅葉一兩半

右細剉以水三升煎至二升去滓看冷煖洗之

烏梅散出聖惠方 治虛勞陰濕痒生瘡

烏梅十四枚 青錢四十文 鹽三錢

右以水酒各一升於銅器內煎至升半去滓看冷暖洗立效一方與臘茶散相隨用之一方有醋一升一方水煎洗

佛手散 治濕疳瘡癬痒痛皮爛

黃丹炒黃二錢 豆粉炒黃二兩

右研勻清油調掃瘡上後摻如聖散

如聖散

石膏　黄芩去皮心各一兩

右為細末乾摻之瘡上内服佛手散

猪寄湯出聖惠方　治虛勞陰濕痒生瘡

猪蹄二枝剉　槐樹寄生細剉一升

右以水五升煮取三升去滓看冷暖洗瘡三五度用之永瘥

玉粉散 治陰瘡浸淫不止

白礬枯 定粉各等分

右細末先浴淨淹乾摻之

鳪鷄散 治陰下濕痒

右用黄鳪鷄以先粉消石為末和飯與鷄食之後取

鷄食甚補益

蒲黄散 治丈夫陰下濕痒

右用蒲黄末傅之三次良○千金論曰有人自少至

長陰下常有乾癬者宜依癬方主之有五勞七傷而得陰下癢濕搔之黃汗出者宜用補丸主之仍須傅藥治亦有患妬精瘡者以妬精方治之夫妬精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門內並似疳瘡作臼齏食之大痛疳即不痛也

苦參湯　療陰囊下濕痒瘡

右煮槐皮苦參黃蘗及香薷汁洗之並良

礬石散出海上方　治陰囊上生濕瘡黃水流注有妨行步

右白礬不以多少研為末入冷水内洗瘡即愈

療陰下濕痒成瘡出聖惠方 右煮桃皮和黍米汁洗之

療陰下濕痒瘡出千便良方

右用甘草一尺以水五升煮取三升漬洗之日三四度便愈

治陰囊濕痒瘡方見本門前下部瘡類即淋滞藥

猪蹄兩脚 槐寄裡白皮切一升

右以水煮洗瘡一日五六遍永瘥

治血驅風散 出仁齋直指方 治肝腎囊濕痒脚下瘡癬

當歸 川芎 白芷 華陰細辛 白蒺藜炒去刺

桃仁浸去皮焙 白芍藥 半夏製 塊苓 五靈脂

甘草生各三錢 蒼朮炒 杜仲姜汁炙炒去絲 辣桂 天

麻 薏苡仁 橘紅 檳榔 厚朴 枳殼各五錢

右剉每服三錢水二盞半姜五片棗二枚煎至七分

濾清暖熱入乳香末少許食前服乳香以佐心氣使

心腎相交或有熱症去桂乳香加黑豆煎

銅緑散出濟生拔粹方 治男子婦人陰部淹瘡

五倍子細研五錢 白礬一錢 銅碌少許 輕粉一字 乳香五分

右為細末洗淨摻之

治男子婦人陰瘡濕痒

右用槐實末摻之及煎水洗之

治陰生濕疱瘡及陰蝕瘡出三因方

右取石硫黄研如粉傅瘡上日三以葱椒白礬湯洗

淨次以藥傅之又方燒杏仁搗塗之

青黛散出危氏方 治下部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便澁食亦減身體不安面微浮腫此食魚蝦發風熱物得之

右馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有神效仍服八正散日三服

生薑平胃散 治腎風瘡及下部濕

右用生薑皮炒燋為末濕者乾傅之乾瘡搔壓香油

調傅如覺熱不可忍用平胃散涼去之或入平腎散於薑皮末内傅之自然伏大熱

宣毒散出洗方　治丈夫陰氣盛陽氣微弱風寒之氣乘虛而客於腎經治陰囊濕痒而微熱一種但痒而不濕一種在陰根並毛際痒一種濕不痒一種無汁者謂之毒氣不洩此藥治之

全蝎微炒　白殭蚕炒去絲嘴　蟬蛻洗淨去土炒焙乾各半兩　石燕三兩醋碎火煅令酥

右末每服二錢用塩酒煮猪腰子一雙蘸藥嚼之以
元煮酒送下用蒸餅乾喫壓之頻服見效此方亦治
腎臟風濕流注生瘡痒甚者亦神效兼用卷栢散洗
卷栢散方出洗 陰濕生瘡出汗痒甚服前藥去腎臟風
此作洗藥
卷栢 荆芥穗 川烏 大艾葉 升麻去下根節
露蜂 脫蚕沙 藁本頭各一兩
右為散每服二兩水三大碗煮取一半濾去滓先薰

後洗瘡安即止大抵人不可以熱湯浴洗得腎氣耗散早年目昏又脚無力

治陰上生瘡似喫虫所食連年不效出護命方


右以糊粉一件食刀上煆令通赤與椒末相衮生油調塗之頻度必效

治陰腫痛用出永類鈐方

苦楝根　白楊根　木香　吳茱萸　柞柳各等分

一方出永類鈐方

蜜陀僧　黄連　硃砂



右為末傅

一方出永類鈐方

五倍子　黃連　膩粉為末

甘草烏豆湯洗拭傅之

又瘡癩疼不可忍出永類鈐方

香豉一合　地龍新糞

水少和成膏塗之

陰邊生瘡濕痒出永類鈐方

柏皮向北不見日者取煎湯洗三黃湯料煎湯

陰囊濕痒生瘡及痕瘡出瘡瘍方

五倍子煨末 輕粉

右為末傅

吳茱萸散出瘡瘍方 治風寒濕注下成瘡

檳榔一兩 硫黃半兩 吳茱萸一分 川烏頭一个

右四味為細末摻瘡上乾者油調傅之

療疳濕時行熱𤺋瘡出本草

以青羊膽和醋服之良

治男子陰痒痛出本草

白殭蚕七枚為末用酒調下方匕

治陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死疼悶不得眠出本草

以大梨根煮汁服立瘥

治陰毒痿出本草

以無食子燒灰用傅之

治陰腎痿弱囊下濕痒出本草

用無名木皮煎取其汁小浴極妙

治丈夫陰囊濕瘡出本草

以鑄鏵鉏孔中黄土為細末摸之亦去陰汗最佳

治陰莖熱瘡出本草

用絲瓜燒為灰傅之

治陰瘻出本草

取露蜂房燒灰酒服之

療瘡及濕痒出本草

用枯柏皮向北不見日處大握水

二升煮之一升洗之三五遍冷復熳若涉遠恐風即

以米粉即效

治陰囊下濕痒及瘡出本草　以槐枝煎湯

治妬精瘡方

麝香散出三因方　治妬精瘡痒而濕者

麝香　黃礬　青礬各等分

右為細末小便後用些小傅之一方治濕生瘡黃流

注白礬不以多少為末先以冷水洗瘡然後傅之

津調散 出三因方 治妬精膿汁淋漓臭爛

黄連 欵冬花各等分 麝香少許一方不用

右為末以地骨皮蛇床子煎湯用軟帛挹乾津調藥傅之最忌不得用湯洗

黛青散 出仁齋直指方 治妬精瘡

右用久年册皮青紙以津唾粘濕貼上明日又重貼勿動自愈用青紙蓋取青黛凉而然後虫紙無生耳

白散子 出三因方 治妬精瘡痒不可忍者及皮膚諸瘡手抓

疽瘡

晉礬不拘多少炒　輕粉每服入少許

右研勻摻瘡上立瘥如治漏瘡每服挑一錢入黃栢末一錢輕粉半錢

訶子散　治妬精瘡方見本門前下部瘡類

田螺散　治妬精瘡

右用大田螺兩箇和殼煆存性為末入輕粉摻所患處即可安一方用麝香少許

麝香散出千金方　治妒精瘡者男子在陰頭節下婦人在玉門内並似疳瘡作半𠝹食之大痛疳即不痛

右用銀釵以綿裹用臘月猪脂薫黄火上煖以釵烙瘡上令熱取乾槐枝熱之塗之以麝香黄礬末傅之小便後即傅之不過三兩度瘥但用疳痢方中藥傅之即瘥

油髪散出仁齋直指方　治妒精瘡陰蝕瘡

乾青黛　款冬花各等分　油髪　青黛各等分

右為末入些麝香或摻或津唾調傅

麝香散 出仁齋直指方 治妬精瘡

乾青黛 款冬花各等分 麝香少許

右為末先以地骨皮桑白皮煎湯溫洗軟帛拭乾次

以津唾調藥傅

治疳瘡即妬精瘡又名陰蝕瘡又名耻注瘡

右用鬼枯蔞煎湯洗患處次用枯蔞灰存性研為末

傅之凡兩次立愈夫邏慾之人多患妬精瘡者以婦

人陰中先有宿精男子與之交接虛熱即成痛初發在陰頭如粟沸之則痛甚矣兩日後濃清作臼孔蝕之大痛婦人亦有此病生在玉門外以疳蝕瘡不痛為異耳出三因方

陰妬蝕瘡

方

洗毒湯 出瘡科精要方 治蝕瘡

苦參　防風　甘草　露蜂房各等分

右㕮咀水煮濃汁洗瘡腫痛

塌腫湯出瘡科精要方 治外陰蝕下疳痷瘡腫痛

芍藥 丹參 白斂 黄芩去黑心各等分

右㕮咀用藥五錢水一升煎十沸帛蘸頻塌之

甘草大豆湯出瘡科精要方 治外陰蝕下疳痷瘡腫痛

甘草二兩 赤皮葱三莖 大豆一合

右用水三升煮豆熟為度槐條一握同煮清汁熱淋浴冷即再溫浸三二時度

豆坯散 出仁齋直指方 治陰蝕瘡

菉豆粉　蝦蟆 各一分　胭脂 半分

右為細末乾摻

雄黃散 出十便良方 治蝕生瘡或痒

雄黃　礬 各二分　麝香 半分

右為末摻瘡即瘥

蒲黃散 出三因方 治陰蝕瘡

蒲黃 三兩　水銀 一兩

右研勻先以豬肉湯浸洗挹以藥摻之

胭脂散出百一選方 治陰瘡

坯子胭脂 真菉豆粉

右同研傅之

洗湯方出聖惠方 治陰下生瘡

地榆 黄栢各八兩

右㕮咀以水一斗五升煮取六升去滓適冷暖洗瘡

日再或只煮黄栢汁洗亦佳

蝦蟆散 出聖惠方 治陰蝕欲盡瘡痛甚者

蝦蟆一枚燒灰 兎糞一兩

右為同研令細日三四度用少許傅瘡上

鷄礬散 出聖惠方 治陰蝕瘡

鷄糞一分 礬 火煎茶一分

右搗更細研如粉先用桑枝葱白豉湯洗後貼藥日三度貼之

黄連粉散 療陰瘡有二種一者作臼膿出名曰陰蝕

瘡二者但赤作瘡名為熱瘡若是熱瘡此方
右以黃連和胡粉末傅之必效一方用胡粉傅之大
驗
又方　治如前
右取黃柏黃芩各一兩切作湯洗用黃連黃柏末傅
之
又方
紫笋茶末一分　荷葉一片燒灰

右為末以鹽漿水調傅之三五度即愈

又方

右取停水處乾地骨皮末傅之神效是長郭承恩用之效

麻仁膏　療人陰生瘡膿出作臼

右取高昌白礬麻仁等分研煉豬脂相和成膏槐白皮作湯瘡拭令乾即塗膏然後以楸葉貼不三五度瘥

治陰蝕瘡

右用肥猪肉五觔水三斗煮令極爛去肉以湯極熱

便以漬瘡中冷即愈

下陰疳蝕

方

烏金散　治疳瘻惡瘡

麝香　蟾酥各一字　粉霜　硇砂　輕粉各一錢

銅碌　砒霜　白乾姜　草烏頭　天南星

舶上硫黃各半兩

右為細末紙撚縱之或浸湯蒸餅和為挺子縱瘡口内上以膏貼之

乳香散 治下疳瘡

乳香 没藥 輕粉 茵丹 龍骨 烏魚骨

黄芩 銅碌以上各一兩 黄連 麝香少許

右細末以溫漿水洗過貼瘡上

陀僧散 治疳瘡

乳香 没藥另研 龍骨 銅碌 枯白礬 赤石脂 黄飛丹 蜜陀僧 烏魚骨 麝香等分

右為細末乾貼之

截疳散 治年深疳瘻瘡大效

蜜陀僧 白歛 白芨 黄丹各一兩

黄連 腦子 麝香各半錢 輕粉一錢

右為細末和勻為散每用或摻或紝瘡中以膏貼之良效

勝㽷散 治一切下疳等瘡

黄栢去皮 黄連揀淨 訶子去核 蜜陀僧各三錢 輕粉 人中白 麝香少許

右為細末用漿水洗渫了乾貼或油潤了貼亦得

愽金散 治下疳蝕臭爛腫痛

麝香 乳香半錢 黄丹 輕粉各一錢 白堊二錢 蜜陀僧半兩 白礬半兩與蜜陀僧同為末相和炒鍋內火上炮汁盡

右為細末先須另用槐枝葱白塩甘草熬湯淋溻洗

一二時挹乾摻上項藥每用藥先須浴然後摻藥甚者三五次瘥

傅藥方　治疳瘡

麝香三錢研　白芨半箇　壞胭脂一錢　輕石膏五文煆

黃栢炙酥淬七次五文　木鱉子二箇去皮核子札之炙酥淬七次

右為細末如爛甚者入炒黃丹三幹甘草

洗藥方　治下疳瘡洗藥

甘草三錢　荊芥一錢　淡竹葉一握　燈心半錢

麥門冬草一握　小蘗一握五七莖

右同剉為麄散湯洗之

甘石散　治下疳瘡

橡斗子燒灰存性二錢　蜜陀僧　蘆甘石各一錢半　輕粉一分　龍骨半錢　麝香少許

右為細末先用荊芥杜仲川椒水煎湯放温浴洗罷然後藥一掺乾貼

蝦蟆散　治疳蝕入諸處但是赤血利久不瘥

蝦蟆一枚五月五日燒灰研　金銀土鍋　人糞灰一方云髮灰各一兩　麝香研一分　銀末小豆許錯

右為末每用少許傅瘡上即瘥痢者吹下部

玄胡散出百一選方　治下疳瘡

玄胡索五文　輕粉五文　石膏五文煆　枇杷葉四片洗去毛　活田螺一箇燒灰以煆白殼為度並肉用

右為末傅之

黄連散　治下部疳瘡陰濕神效

黃連　黃栢各半兩　輕粉二錢　枯礬　黃丹各一錢

右為細末漿水葱白湯渫洗後乾貼之

金銀花散出德生堂經驗方　治下疳瘡

金銀花　荆芥　蛇床子　朴硝　甘松　白芷　梹榔各一兩

右㕮咀每用五錢水五碗加葱白二根同煎數沸盆

水洗蒸後洗即上藥末

乳香散　治下疳瘡

乳香　麝香　輕粉　白礬　黄丹　大梔子等分

右将梔子切開去仁安前五味藥在内繫定燒成灰

為細末貼瘡上

金銀花散出百一選方　治下疳瘡

竹蛀屑少許　金花胭脂四箇　海鰾鮹一箇　麝香三十文　石膏五文煅

右為細末傅之

丹髮散　治下疳瘡

白礬_{為末} 黄丹 穿山甲_{洗焙} 人髪_{剪細香等分}

右停用橡斗盛兩箇合定住用膠泥固濟原炭火燒過取出冷定打破橡斗内取藥研細末加輕粉麝香少許和匀瘡上用漿水洗淨無𧉮帛揾乾將藥貼填三二次即愈

黄連輕粉散_{出醫方集成} 治腎瘡

用抱鷄卵殼鷹爪黄連輕粉等分為末煎清油調塗

香附子白芷五倍子煎水洗之一方有黄丹

龍骨散　治疳瘡

烏魚骨　赤石脂　龍骨　孩兒茶等分

右為末乾貼之

麝香散出瑞竹堂方　治男子下疳瘡

白礬煆過　輕粉　麝香　螃蟷就活壓去尿焙乾

右為細末貼瘡上三兩次先以口含漿水洗淨搵乾

用藥

僧伀散　治下陰疳瘡

蜜陀僧半錢 甘草炒燋一分 黄丹炒一錢 麝香一分

右為細末乾貼或香油調上大有效驗

輕粉散 治疳瘡漏

輕粉 没藥 乳香 蜜陀僧各等分

右為細末熬漿水葱白湯洗淨口瘡淹乾用藥貼之

麝香散 治下陰疳瘡

右用乾瓦一片鋪黄丹一錢上鋪白礬一兩枯盡為

末研入麝香膩粉少許同研勻先用葱白湯洗了上

之甚妙

上沸散 專治一切疳瘡疾

白礬皂子大 乾胭脂少許 鍋煤已上約量勻准奪 狗糞

下土狗量分

右為細末洗淨瘡乾貼之

烏金散 貼惡瘡瘻瘡

右用橡子二箇內一箇實白礬末相合定用黑梢麻皮纏了火內燒研加麝香少許洗淨瘡貼之

輕粉散出神效方　治疳瘡

馬明退燒灰三錢　輕粉少許　乳香少許

右為細末先以溫漿水淨乾摻之

䐉脛散　治疳瘡連年月深不退者疳病重欲死此藥

麝香少許各等分用漿水洗就溫搽即可

朱粉散　治諸疳瘡多時不效

訶子一兩　枯白礬半兩　黄丹二錢炒

右為細末先用溫漿渫了傅之效

佛手散 治男子婦人下疳瘡

人中白五錢鈇上炒 輕粉半錢 麝香一字

右為末口含塩水洗淨瘡搵乾貼之如鼻血不止口含水鼻內嗃有效

螻蛄散 治疳瘡漏年久不效

螻蛄上截放於葱筒內陰乾三分 麝香少許二味

右為末蟾眉汁恴着手和為丸如芥子大每服用一丸為絍在瘡上

蟾麝散　治痔瘡漏

膽礬二錢　蟾酥一字　麝香少許

右為細末用蒸餅心和丸芥子大紝在瘡内

龍骨散　治冷痔

空肚草乾為末　龍骨生用　虎骨濕紙裹衣灰火内煨存性

右為細末傅之

乳石散出神效方　治痔瘡久不愈者

海孔石燒紅醋淬數次二錢　金銀花一錢

右為細末每服二錢半如薟茶一般每服用二服如
病一年服藥半年則愈
栟櫚散　治痔瘡浸淫不愈
右用栟櫚燒灰存性為末入輕粉用蒸飯甑蓋上滴
淚調傅之立效
梔子散　治下痔瘡
右用梔子一箇去瓤裝入明礬末麪糊合口火燒熱
存性為末洗淨乾摻上隨效

五倍子散　治下疳瘡

右用孩兒茶爲末五倍子燒灰存性加龍骨貼之

黄僧散　治疳瘡

黄栢　蜜陀僧各等分

右爲末如泥葱白漿水洗淨乾貼之一方有硃砂

砂糖散　治諸般疳

右用砂糖與麵各五錢同炒熟加梹榔末一兩無時吞喫

蟯螂散 出德生堂經驗方 治冷痔透骨相穿膿水常流不愈者

右可用屎蟯二三箇炙令乾研為末加輕粉一錢和勻却用烏龍德生膏藥揑作定子蘸藥入瘡孔内又再用膏藥外貼在瘡上換用藥頻上直至生肉為驗

銀粉散 出危氏方 治下痔瘡陰頭生瘡

右用墻上白螺螂不以多少火上煅酥為細末於水内飛過土石麄者次用輕粉隨分兩入在藥内每用

少許乾貼在瘡上一方不用膩粉仍生塩水洗五七次後以藥傅之

枯礬散 治痔瘡

燒棗子存性 枯白礬

右為末乾用油調濕則乾傅如不效再加二味五倍存性青黛

應效散 出瑞竹堂方 治下痔

右用地骨皮不以多少陰乾杵為末每月紙撚蘸絍

瘡内頻用自然生肉更用米飲調二錢無時日進三服

立效方出瑞竹堂方　治下疳

用燈心灰入輕粉麝香少許乾貼之濕小油調貼

桃花散　治下疳瘡

青蛤粉一兩　黃丹炒二錢

右為細末乾貼之立效

鯽魚湯出聖惠方　治陰生瘡蝕欲落者

鮮鯽魚去腸肚鱗

右用蜜陀僧細研滿填魚腹用線縫合用慢火炙令乾不得燋黑搗為末入麝香一錢細研每用藥先以暖鹽漿水洗冷淨潔用輕帛拭乾避風貼散以帛慢緊一日一洗一換五七日瘥

枯礬散 治疳臁瘡

右用黃栢末枯礬二味和匀乾掺瘡上

白芷散 治疳瘡

右用甘草節白芷五倍子水煎溫洗

治下疳瘡出德生堂經驗方

右以孩兒茶研細為末先淨洗則小油調傅濕則乾搽上神效

治疳瘡方出海上名方

右用透明膠香為末入輕粉少許摻之乾則麻油調抹

五倍散出百一選方 治下疳

五倍子　甘草　滑石各一錢　號丹一字

右為細末先以甘草湯或漿水湯洗之傅藥一方無滑石

治惡瘡瘻疳出百一選方

右治爛甚出濃不淨者以活地龍二十條洗淨了用餅子盛之以重紙裹開一竅夜間入患處令地龍食瘡濃盡明日傅藥如覺痒不妨可令患人知

治疳瘡浸滛不愈

右用糯米燒灰存性為末傅之

治痔瘡 右用板門背後飛塵羅過虀水洗淨乾貼之即愈

治痔氣入陰胞囊腫大

用黃栢燒灰存性猪膽汁調敷

凡下痔久不愈方

右俗呼腂痔可以導水丸禹功散先瀉肝經乾以木香散傅日上三兩度後淡粥一二日止

立應散 出楊氏家傳方 治疳瘡

麝香 半錢另研 黃栢皮 一錢 黃丹 一錢匕上飛過另研 白礬 半兩匕上飛過研 地龍糞 一兩匕上焙乾另研

右件研勻溫水洗瘡口用挹乾用藥摻患處日用三次

斂肌散 出楊氏家藏方 治下疳瘡

牡蠣 火炙 密陀僧 研 橄欖核 燒灰 蠟茶 四味各等分

右件為末乾摻瘡上如乾摻不止即以油調傅之

地龍散出楊氏家藏方　治下疳瘡

地龍糞韮菜地内者不以多少火煆過

右為細末入膩粉少許同研匀先以甘草湯洗了後用藥乾掺或油調傅亦得

換肌散出衞生家寳方　治下疳瘻治一切惡瘡下瘡力男子陽瘡也

蜜陀僧研細炒一錢　膩粉一錢　黄蘗皮研為末用炒一錢半

右同和匀末先以温湯洗用軟帛子乾掺上患甚者不過三次即愈

癩風附論

癩風證治男子精血不調爲風冷所襲致陰下濕痒之不已流注手脚悉生瘡瘍名曰癩風世謂腎臓風者乃認癩爲腎也癩屬宗筋系於肝胃陽明養之陽明主肌肉消經流入四肢生瘡正胃之癩風非腎臓風也

方

蒺藜散出仁齋直指方　治癩風上攻耳鳴目眩下注陰濕瘡痒

蒺藜炒杵刺　草烏頭水浸三日逐日換水去皮各半兩　白芷

白附子生　蒺藜　蒼朮炒　荆芥穗各二錢半

右為細末米糊丸如梧桐子大每服三十丸上則茶

清下則鹽酒服

烏頭煮鹽方出三因方　治腎臟氣虛癩風入胃上攻頭痛

眼赤眵淚昏澁口乾咽燥下注四肢疼痛歷節陰下

濕痒足脛腰膝遍生瘡風水浮腫

川烏頭洗淨者大破開小者全用　蒼朮　吳茱萸各四兩　京

三稜半兩　白鹽十二兩水煮四味候烏頭透控乾洗淨鹽

右為末米糊丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒鹽湯任下之凡水病必忌鹽此藥用鹽無所忌

四生散出三因方　治癩風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四肢瘙癢遍體生瘡及婦人血風瘡

白附子　沙苑蒺藜　黄耆　羌活各等分

右為末每服二錢鹽酒送下或豬腎破開入鹽摻藥

間煨服亦佳一方用腰子一枚切開去筋膜入藥少許於内濕紙裹煨炮熱再入藥三錢浸酒調藥並腰子嚼喫令盞底淨盡三五服或只用鹽酒調亦可或腰子一枚分兩次用羊腰猪腰皆用雄猪羊者為妙

蛇床子散　温中主藥

右以蛇床子仁為末以白粉少許和令勻相得如棗大綿裹之自然温矣

陰汗附論

夫虛勞損腎氣不足故陰汗冷夜自泄風邪乘之則搔痒也

方

海桐皮散　治陰囊濕痒

黄連　全蝎　硫黄　花椒　大腹子　樟腦

海桐皮　白芷　輕粉　黄皮　蛇床　枯礬

榆樹皮　斑蝥少許　桎樹皮　萹草

右為細末臘油調傅

山茱萸散出御藥院方　治腎氣虛弱陰囊多汗或冷腫痛不消或牽引少腹時發疼痛並皆治之

山茱萸　吳茱萸　硇砂飛　紫稍花　零陵香　藿香葉　丁香皮以上各半兩　木通　細辛　木鱉子　天仙子　蛇床子　續斷　遠志各二錢

右為麄末每服用一匙水一碗煎五七沸先以熱氣薰後浴亦益避風

琥珀藥出御藥院方　治陰囊瘙痒不已及自汗不收

西琥珀　黄丹各六錢　枯白礬一錢　麝香四錢　龍泉粉二兩

右為細末每用半錢摻在手心於患處擦

牡蠣散　治男女陰汗濕冷痒疾

牡蠣灰　蛇床子　川烏　兎絲子　良薑各半兩

右為細末用藥三錢白麪一錢酒醋熱調勻渫洗浴之或塗外腎帛包尤妙

浥乾方出御藥院方　治津液不散攝泄汗玄府不閉腠踈

汗多不止

滑石二兩　白芷　寒水石粉半兩　黃丹坐看多少用顏色如桃紅為度

右為極細末和勻每用乾摻患處

蛇床湯　治囊濕

蛇床子　吴茱萸　荆芥　細辛

右各件少許煎湯洗之多年壁上土細碎紗袋盛撲即可

乾荷葉散出御藥院方　治陰囊腫痛濕潤瘙痒及陰痿弱

乾荷葉　牡蠣粉　蛇床子　浮萍草各等分

右為細末用羅篩每用兩匙一大碗同煎三五沸濾去滓淋渫洗避風冷

眞蛤散出仁濟直指方　治陰汗濕痒

蘆甘石一分緑者　眞蚌粉　黄連　五倍子各半分一名文

蛤一方用油調傅之妙

右為細末摻洗以蜂房大腹皮煎湯温洗

牡蠣蛇床子散　治陰汗

右用牡蠣和麻黄根蛇床子乾姜為粉傅之

盐梅湯　療陰囊下濕痒皮剥

右用烏梅十四枚錢四十文三撮盐苦酒一升於銅器内総漬九日洗之又煮槐皮黄栢汁及香菓汁並良

爐甘石散　出仁齋直指方　治陰汗濕痒

緑色爐甘石一分　真蚌粉

右為細末撲傅

陀僧散出百一選方 治陰汗神效

右用蜜陀僧好者研令極細蚌粉撲使之乾瘡用津調傅

五加皮湯出海上方 治陰痒有汗

右用五加皮煎湯洗之蜜陀僧撲之百藥煎末傅之

安腎丸出危氏方 治陰汗不止

右以安腎丸用舊乾醬煎湯入塩少許吞下

大蒜丸出危氏方 治陰濕痒

右用大蒜不以多少煨剥去皮爛研淡豆豉末搜丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸棗子燈心煎湯送下

洗方出危氏方 治陰汗濕痒

用蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

治陰痒汗出出肘後方 右嚼生大豆黄塗之亦療尿瘡

東垣先生蘭室秘藏方

一富者前陰間常臊臭者又因連日飲酒服中不和

應之經曰前陰者足厥陰肝脉絡之陰器出其挺末

凡臭者心之所主散入五方為臭入肝為臊此其一

也當於肝經中瀉𨙨間是其本後於心經中瀉少衝

乃治其標酒者氣味陽能生裡之濕熱合於下焦為

邪故云下焦如瀆又云在下者引者竭之酒者是濕

熱之水亦宜決前陰以去之是合下焦二法之治

清震湯　治陰部時痒而有臊臭之狀

柴胡稍一錢　澤瀉一錢　車前子半錢　木通半錢　生地黄三分　當歸稍三分　草龍膽三分

右件煎藥剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去滓稍熱服空心腹中宿食消盡服之便美饍壓之

此藥柴胡入肝為引用澤瀉車前子木通其滲泄之味利小便赤除臊氣是名在下者引而竭之生地黄草龍膽之苦寒瀉酒熱更前兼車前子之類以徹肝中邪氣肝生血用當歸以滋肝中血不足也

固眞湯　治兩冷前除痿弱陰汁如水小便後有餘滴

尻臀並前陰冷惡寒而喜熱膝下冷

升麻稍二分　羌活稍一錢　酒黄栢一錢　蒼朮半錢

柴胡稍一錢　炙甘草一錢　草龍膽二分　澤瀉一錢半

黄栢二錢　知母二錢

右剉如麻豆都作一服水三盞煎至一盞去滓稍熱

服空心腹時服之以早飯壓之恐犯腎氣

瀉肝湯　治小便弱黄臊臭淋瀝兩丸如氷陰汗浸多

升麻半錢 柴胡五分 羌活根一錢 酒黃栢一錢 蒼术半錢 漢防已一錢 紅花一錢 藁本二分 當歸二分 猪苓三分 澤瀉四錢 黃芩半錢 麻黃根三分

右件剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去滓臨卧服大忌酒濕麵

青紅湯 治外腎冷兩髀陰汗前陰痿陰囊痒臊氣

柴胡二錢 甘草梢二錢 酒黃栢二錢 升麻一錢半 當歸稍一錢 漢防已一錢 紅花一錢 羌活稍一錢

澤瀉一錢半　麻黄根一錢　草龍膽一錢　一茯苓一錢　五倍子二十箇

右剉如麻豆大都作一服水三盞煎至一盞去滓稍熱服食前忌酒濕麪房事

椒粉散　治前陰兩凡濕痒秋冬尤甚夏月微減

麻黄子一錢　黑狗脊半錢　斑猫一錢　猪苓三分　肉桂二分　當歸稍三分　輕粉少許　紅花少許　蛇床子半錢　小椒

右爲末乾摻上避風寒冷熱處坐卧

補肝湯　治前陰氷冷並陰汗兩脚瘦弱無力

黄耆七分　人參三分　炙甘草根半錢　葛根三分　升麻四分　柴胡二分　羌活二分　陳皮二分　當歸二分　黄連一分用連麴　黄栢二分　白茯苓三分　澤瀉二分　蒼朮半錢　麴末二分　猪苓二分　知母一分　防風二分

右剉如麻豆大都作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服空心忌酒濕麪

淋渫藥丁香散　出御藥院方　治腎氣虛弱陰囊多汗或冷腫痛不消或牽引少腹時發疼痛並皆治之

紫稍花　丁香　肉桂　蛇床子　吳茱萸　細辛　去苗以上各半兩

紅豆　川芎　莨菪子　黑狗脊　藿香葉　甘松　山茱萸　以上各一兩

蜀椒　微炒一兩

香附子　羌活　芭戟　木香　甜葶藶　香白芷　槐子　炒

芸薹子　天雄　炮裂不去皮已上各三分

右件另麁末每用酸漿水三升藥末一兩塩少許煎

五七沸漸漸乘熱小浴下部臨卧用之

濕腎湯出試效方 治面色痿黃脚痿弱無力陰汗陰莖有夭色

麻黃六分 防風一錢半 白术一錢 澤瀉二錢 猪苓 白茯苓一錢 升麻一錢 柴胡一錢 酒黃栢一錢 蒼术一錢半

右件分作二服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服食前一大晴明服之候一時辰方食

治陰汗出本草　無食子燒灰先以微溫湯浴了即以帛

微裛後傅灰囊上甚良

治陰汗出本草　硇砂損陰

以莨菪子煎湯洗之

方

猪蹄湯　避迫著硇砂損陰

猪蹄一具劈破　浮萍草三兩

右以水三升煮取半升去滓以瓶子盛汁內陰瓶中

漬之冷即出拭乾便傅後藥粉之

又粉法

薔薇根皮　黄蘗各三分　朴硝　蛇床子各一分


甘草一分炙

右為散用前法浸洗後以敷瘡上

鷄子治　主著硇砂

右取鷄子一枚煮熟剥取肉更用生鷄子二箇傾取

白和熟研令細以帛裹之立定



甘蘖散　主著硇砂

甘草　黄栢　白礬燒令汁盡

右為末傅之瘡上

普濟方卷三百一